

Branca specialistica

MEDICINA DI LABORATORIO

Prestazioni eseguibili con preparazione

ESAMI EMATOCHIMICI E CITOLOGICI

| TIPO INDAGINE | PREPARAZIONE PER IL PAZIENTE |
|---|--|
| CITOLOGIA URINARIA | L'esame citologico va eseguito su 3 campioni di urina raccolti in 3 giorni successivi. La raccolta delle urine va iniziata nei 2 giorni precedenti la data della consegna dei campioni. <i>(Esempio: se la consegna è per il lunedì, le urine dovranno essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì mattina).</i> Per effettuare l'esame il Paziente deve recarsi al CEMS per il ritiro del KIT di raccolta, nel cui interno sono riportate le istruzioni. |
| DOSAGGIO DI PROLATTINA/PULSATILITA' DELLA PROLATTINA | Presentarsi in laboratorio ore 7:30. Il test prevede un periodo di 10 minuti di stabilizzazione in posizione distesa o seduta prima di eseguire il prelievo. Tempo di permanenza: 20 minuti se richiesto un solo dosaggio; 1 ora se sono richiesti 2 dosaggi. |
| DOSAGGIO DI RENINA E/O DI ALDOSTERONE (IN CLINOSTATISMO) | Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in laboratorio alle ore 7:30. Il test prevede un periodo di 2 ore di stabilizzazione in posizione distesa prima di eseguire il prelievo venoso. Tempo di permanenza: 2 ore |
| ESAMI SU LIQUIDO SEMINALE (spermiocoltura) | Possono essere raccolti e consegnati la mattina al laboratorio e non necessitano di precedente astinenza sessuale. Il contenitore sterile (<i>vasetto di plastica con tappo a vite</i>) è distribuito da: Laboratorio, Farmacia, Parafarmacia, Articoli Sanitari). |
| ESAMI SIERO DEL SANGUE | Presentarsi all'ora stabilita a digiuno dalla sera prima, con l'indicazione dei valori sanguigni da ricercare. |
| GASTROPANEL | Il test consente di valutare la presenza di gastrite. Il paziente deve sospendere per almeno 15 giorni qualsiasi terapia farmacologica effettuata con antibiotici o farmaci che agiscono sulla secrezione gastrica, salvo diverse indicazioni del medico curante. Il giorno prima dell'esecuzione del test il pz non deve assumere alcolici e deve rimanere a digiuno dalla mezzanotte. |

| | |
|---|---|
| <p>RACCOLTA DELLE FECI PER ESAME COLTURALE/CHIMICO FISICO</p> | <p>Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (<i>un'oliva se solide, alcuni millilitri se liquide</i>).</p> <p>È preferibile raccogliere le feci la mattina stessa della consegna al laboratorio o al limite la sera prima e conservare in frigorifero. Nel caso di prescrizioni di raccolte multiple (<i>di solito tre campioni</i>) raccolta e consegna devono avvenire in tre mattine successive.</p> <p>Il contenitore (<i>vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola</i>) è distribuito da: Farmacie, Parafarmacie, Articoli Sanitari.</p> |
| <p>RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA PARASSITI</p> | <p>Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (<i>un'oliva se solide, alcuni millilitri se liquide</i>).</p> <p>Non riempire mai completamente il contenitore, chiuderlo accuratamente.</p> <p>È preferibile raccogliere le feci la mattina stessa della consegna al laboratorio o al limite la sera prima e conservare a temperatura ambiente.</p> <p>Il contenitore (<i>vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola</i>) è distribuito da: Farmacie, Parafarmacie, Articoli Sanitari.</p> |
| <p>RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO</p> | <p>Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (<i>un'oliva se solide, alcuni millilitri se liquide</i>).</p> <p>Non riempire mai completamente il contenitore, chiuderlo accuratamente.</p> <p>Conservare in frigorifero fino alla consegna al laboratorio.</p> <p>Nel caso di prescrizioni di raccolte multiple (<i>di solito tre campioni</i>) la consegna può avvenire in un'unica soluzione alla fine delle raccolte.</p> <p>Il contenitore (<i>vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola</i>) è distribuito da: Farmacie, Parafarmacie, Articoli Sanitari.</p> |
| <p>RACCOLTA DELL'ESCREATO</p> | <p>Raccogliere il campione al mattino, a digiuno in un contenitore sterile (tipo per urine). Prima della raccolta pulire il cavo orale con gargarismi effettuati con acqua.</p> <p>Raccogliere il secreto profondo eventualmente aiutando con colpi di tosse.</p> <p>Consegnare al laboratorio (entro e non oltre tre ore).</p> <p>Campioni superficiali salivari non sono idonei.</p> <p>Il contenitore sterile (<i>vasetto di plastica con tappo a vite</i>) è distribuito da: Laboratorio, Farmacia, Parafarmacia, Articoli Sanitari).</p> |
| <p>RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE (con o senza conservanti)</p> | <p>Scartare la prima pipì del mattino (ore 7);</p> <p>Raccogliere tutte le urine del giorno, della notte e le urine della prima minzione del giorno successivo (ore 7);</p> <p>Le urine andranno raccolte in apposito contenitore e conservate in frigorifero.</p> <p>Il contenitore per la RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE (<i>barattolo cilindrico o a forma di tanichetta</i>) è reperibile nelle Farmacie, Parafarmacie, Articoli Sanitari.</p> |
| <p>SCOTCH-TEST PER RICERCA PARASSITI</p> | <p>Ritirare in laboratorio un vetrino portaoggetti con l'astuccio.</p> <p>Al mattino appena svegli, applicare una striscia di nastro adesivo trasparente (di dimensioni simili al vetrino fornito) sulla cute intorno all'ano e lasciarla per almeno un'ora.</p> <p>Poi togliere il nastro adesivo e farlo aderire ben steso, sulla superficie del vetrino.</p> <p>Consegnare la mattina stessa al laboratorio.</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| TAMPONE CUTANEO | Non lavare e/o non disinfettare la zona di prelievo. Le unghie non devono essere state tagliate nei giorni precedenti e non deve essere stato fatto uso di disinfettanti o antifungini. |
| TAMPONE FARINGEO E NASALE | Non eseguire gargarismi o risciacqui del cavo orale. Non lavare i denti. Non fumare nel periodo precedente l'esecuzione del prelievo. Se tampone nasale: non instillare farmaci nel naso nelle ore precedenti il prelievo |
| TAMPONE URETRALE | Non urinare nelle 4 ore precedenti il prelievo. Aver cessato qualsiasi terapia antibiotica da almeno 1 settimana. Astensione da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame Per le donne: non essere in periodo mestruale; l'esame andrebbe eseguito almeno 3 giorni dalla fine del ciclo mestruale. |
| TAMPONE VAGINALE E/O PAP-TEST | Non va eseguito durante ciclo mestruale, quindi tra 10° e 20° giorno Astensione da rapporti sessuale almeno 24h prima dell'esame Non eseguire lavande vaginali pre-esame da 24/48 h Sospendere eventuali farmaci locali da almeno 6 gg. Se si assumono farmaci, non specifici per la sede da trattare, per via orale non sussiste problema all'esecuzione |

PRESTAZIONE PRENOTATA

.....

IL GIORNO ALLE ORE

In caso di rinuncia o impedimento, si prega di informare quanto prima l' accettazione al numero 045/9230404.