

**PREPARAZIONE AL TEST DI
PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA**

Gentile Signora/Signore,

per l'esecuzione dell'atto sanitario **TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA** le raccomandiamo di seguire quanto di seguito riportato.

Portare tutta la documentazione precedente inerente al problema: cartelle cliniche, esami di laboratorio, referti di visite specialistiche, referti radiologici, la richiesta del medico di base/specialista e di far segnalare dal proprio medico particolari allergie/patologie.

Essere a digiuno da almeno 2 ore

Al fine di eseguire l'esame di Test Broncoreattivo con Metacolina è necessario sospendere i seguenti farmaci:

TIPOLOGIA FARMACI DA SOSPENDERE	TEMPISTICA DI SOSPENSIONE
Anticolinergici a lunga durata d'azione: Tiotropio (Spiriva)	5 giorni
Antistaminici: Cetirizina (Cerchio, Formistin, Reactine, Zirtec), Levocetirizina (Xyzal), Loratadina (Clarityn, Fristamin), Desloratadina (Aerius)	3 giorni
β_2 agonisti broncodilatatori a lunghissima durata d'azione: Vilanterolo associato a steroidi (Relvar, Revinty)	48 ore
β_2 agonisti broncodilatatori a lunga durata d'azione: Formoterolo (Atimos, Eolus, Foradil, Oxis), Formoterolo associato a steroidi (Formodual, Foster, Inuver, Symbicort, Sinestic, Gibiter, Flutiformo), Salmeterolo (Arial, Salmetedur, Serevent), Salmeterolo associato a steroidi (Aliflus, Seretide)	36 ore
Antileucotrenici: Montelukast (Luckasm, Montegen, Singulair); Teofilinici per via orale: Aminomal, Diffumal, Respicur, Theo-Dur, Theolair	24 ore
Anticolinergici a breve durata d'azione: Ipratropio (Atem), Ossitropio (Oxivent)	12 ore
β_2 agonisti broncodilatatori a breve durata d'azione: Fenoterolo (Diosberotec), Salbutamolo (Broncovaleas, Ventolin), Salbutamolo associato a steroide (Clenil compositum, Plenaer), Salbutamolo associato ad anticolinergico (Breva)	6 ore

Presentarsi in accettazione almeno 15' prima dell'appuntamento.

Comunicare al Medico, prima dell'esame, eventuali criticità e/o patologie.

Si precisa che non è possibile sottoporre a test di provocazione bronchiale aspecifico con metacolina soggetti di età inferiore a 5 anni.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE MODULO E DI RICHIAMARE IN CASO DI DUBBI O NECESSITÀ

CONTATTI:

Il CEMS può essere contattato nelle seguenti modalità:

- Telefono: 045. 9230404
- Whatsapp: 3385364550
- E-mail: info@cemsverona.it