

PREPARAZIONE AL PRICK TEST**MPR_AMB-006**
Rev. 0 del 13.12.23**Gentile Signora/Signore,**

per l'esecuzione dell'atto sanitario **PRICK TEST** le raccomandiamo di seguire quanto di seguito riportato:

Portare tutta la documentazione precedente inerente al problema: cartelle cliniche, esami di laboratorio, referti di visite specialistiche, referti radiologici, la richiesta del medico di base/specialista e di far segnalare dal proprio medico particolari allergie/patologie.

PREPARAZIONE

Al fine di eseguire il Prick Test è necessario che il Paziente:

- Sospenda la terapia farmacologica antidepressiva di categoria Tricyclic nei 15 giorni precedenti l'esecuzione del test.
- Sospenda la terapia farmacologica antistaminica e/o cortisonica per via orale nei 7 giorni precedenti l'esecuzione del test.
- Sospenda la terapia farmacologica antistaminica per via nasale nei 3 giorni precedenti l'esecuzione del test.
- Sospenda la terapia farmacologica a base di farmaci gastroprotettori antagonisti dei ricettori istaminici H2 per via orale (es. ranitidina, cimetidine) nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del test.
- Dopo l'esecuzione del test il paziente riprenderà la terapia farmacologica precedentemente in atto.

AVVISO IMPORTANTE

Presentarsi in accettazione almeno 15' prima dell'appuntamento.

Comunicare al Medico, prima dell'esame, eventuali criticità e/o patologie.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE MODULO E DI RICHIAMARE IN CASO DI DUBBI O NECESSITÀ

CONTATTI:

Il CEMS può essere contattato nelle seguenti modalità:

- Telefono: 045. 9230404
- Whatsapp: 3385364550
- E-mail: info@cemsverona.it